对《我国鸟类在云南省的新纪录》一文的异议*

郑宝赉

（中国科学院昆明动物研究所）

SUSPICION AGAINST THE "NEW RECORD OF BIRDS OF YUNNAN IN CHINA"

Zheng Baolai

(Kunming Institute of Zoology, Academia Sinica)

作者于1985年4月至7月在横断山区南端，属云南省红河州与越南毗邻的大围山、黄连山等地区参加了鸟类考察（考察报告见专刊报导）。在整理标本总结资料过程中，参阅了《我国鸟类在云南省的新分布》一文（何纪昌等，1982年刊载于《云南林学院学报》）。发现其中纪录分布在红河州的鸟类中，有的种类为文献早已记载而非为"新分布"。有的鸟类，如小星头啄木鸟，若非游荡和迷失的情况，其分布不应及于中国南部。为此，作者查考了收藏在云南大学生物系采自红河州在上述一文中纪录为云南新分布的标本。结果如下：

非为云南新分布的鸟种有：

1.青脚鹬*Tringa nebularia* (Gunnerus)

Bangs & Phillips (1914) 早在本世纪初就记录了在云南南部蒙自获得8号青脚鹬，鉴定为*Tringa nebularia giottoides*。在Rothschild (1927) 初次对云南鸟类所作的比较详尽完整的《云南鸟类区系》的著作中，将*Tringa nebularia glottoides*列为*Tringa nebularia*的同物异名。此鸟为单型种。郑作新（1976）的系统名录中，也记录了此鸟在云南的分布。

2.扇尾沙锥*Capella gallinago gallinago* (Linnaeus)

Bangs & Phillips 在前引一文中，报导了在蒙自获得一只 *Gallinago gallinago*。嗣后，在Rothschild (1927) 的著作中将之归于*Capella gallinago raddei*。后者已被列为*Capella gallinago gallinago*的同物异名。此鸟在云南的分布也见于《中国鸟类分布名录》（郑作新，1976）。

3.红嘴鸥*Larus ridibundus* Linnaeus

在二十年代，Riley (1931) 就记录了红嘴鸥于冬季在云南西北部与四川接壤的泸沽湖（海拔约3,200公尺），以及玉龙雪山（海拔约3,200公尺）越冬，并采得红嘴鸥雌鸟、雄鸟和雌性幼鸟。它们被录为*Larus ridibundus sibiricus*，为*Larus ridibundus*的同物异名。郑作新（1976）也概述了红嘴鸥在云南全境越冬。

4.黑鹎*Hypripetes madasgascariensis leucocephalus* (G, elin)

此鸟在云南的分布虽未记载于《中国鸟类分布名录》，但Rothschild (1927) 报导过 Bangs & Phillips于3月、4月和11月在蒙自获得黑鹎白头型的亚种*leucocephalus*。当时，他们将白头型的黑鹎鉴定为*Microscelis leucocephalus leucocephalus*，即现沿用名称*Hypsipetes madasgascariensis leucocephalus* 的同物异名。

5.红胁蓝尾鸲*Tarsiger cyanurus cyanurus* (Pallas) （下转392页）

---

* 承蒙云南大学生物系惠借标本，谨致谢忱。

本文1986年4月22日收到。